



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Trento

Dipartimento di Radiodiagnostica

SCHEMI DI PREMEDICAZIONE PER ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO (MDC)

Riferimento: Procedura per la gestione delle reazioni avverse da MDC

ESAMI IN ELEZIONE

Pazienti con PREGRESSE REAZIONI AVVERSE (RAv) da MdC

13 ORE prima dell'esame radiologico	PREDNISONE 50 mg per os
7 ORE prima dell'esame radiologico	PREDNISONE 50 mg per os
1 ORA prima dell'esame radiologico	PREDNISONE 50 mg per os CETIRIZINA 10 mg per os

Pazienti con FATTORI DI RISCHIO PAZIENTE DIPENDENTI

- mastocitosi sistemica
- orticaria/angioedema cronica non controllata da terapia
- angioedema ricorrente
- pregressa anafilassi idiopatica
- asma bronchiale instabile, non controllato da terapia (ev. valutazione mediante test di controllo dell'asma)

12 ORE prima dell'esame radiologico	PREDNISONE 50 mg per os
2 ORE prima dell'esame radiologico	PREDNISONE 50 mg per os CETIRIZINA 10 mg per os
1 ORA prima dell'esame radiologico	MONTELUKAST 10 mg per os

ESAMI IN URGENZA

Adatta a qualunque condizione (paziente con pregresse RAv da MdC, paziente con fattori di rischio paziente dipendenti)

Nell' ORA precedente l'esame radiologico (almeno mezz'ora prima)	IDROCORTISONE 200 mg per via ev CLORFENAMINA 10 mg per via im
--	--