

<p style="text-align: center;">  Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio e Servizi </p>	<p style="text-align: center;"> Modulo Dipartimentale Modalità di raccolta del campione di ESCREATO per ESAME COLTURALE LINGUA URDU </p>
---	--

کلٹر ٹیسٹ کے لئے اسپیوٹم لینے کا طریقہ کار

- اس ٹیسٹ کے لئے آپ ایک جراثیم سے پاک کھلے منہ والی بوتل استعمال کر سکتے ہیں جس کی پیچ والی ڈاٹ ہو اور جو آپ کسی بھی دواخانے یا لیبارٹری سے لے سکتے ہیں۔
- صبح اُٹھ کر سمپل لے لیں۔ اگر مصنوعی دانتوں کا چوکا ہو تو اس کو ہٹا دیں۔ اچھی طرح سے منہ گلے کو صاف کریں، سلائن سلشن سے یا کشیدہ پانی [ڈسٹنڈ وٹر] سے یا غرارہ کلی سے۔
- زور سے کھانس کر بوتل کے اندر اسپیوٹم کے کم از کم 2 ایم ایل پھینک دیں، جو نچلے تنفسی سسٹم سے ہونے والا ہو۔ یاد رہے کہ بوتل میں اپنا تھوک اور ناک کی سکرشن نہیں ہونا چاہیئے، ورنہ یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔
- بوتل کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔
- جلدی سے سمپل لیبارٹری کو پہنچا دیں (ایک گھنٹے تک) یا فرج میں رکھیں 4 ڈگری تک لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں (کیونکہ کچھ دو گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ دوسرے نقطہ نظر سے دگر مائیکرو۔ جراثیم دوسروں کے خلاف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے نتیجے تک پہنچ پانا مشکل ہو جاتا ہے
- اگر زیادہ سمپل لینا ہو مختلف دنوں میں، تو ہر ایک سمپل روز کے روز دینا ہوتا ہے ایک گھنٹے تک۔