

**Méthode de recueil de l'échantillon d'EXPECTORATION pour EXAMEN CULTURAL**

- Utilisez, pour le recueil, un récipient stérile doté d'une grande ouverture et d'un bouchon à vis, fourni par le laboratoire ou à acheter en pharmacie.
- Le matin, retirez les éventuelles prothèses dentaires mobiles et effectuez le nettoyage de la cavité orale avec de la solution physiologique, de l'eau distillée ou avec des collutoires et des gargarismes.
- Expectorez dans le récipient stérile en générant un coup de toux efficace ; recueillez au moins 2 ml de sécrétion des voies respiratoires basses. N'introduisez ni salive ni sécrétions nasales (dans ce cas, l'échantillon n'est pas considéré comme approprié).
- Revissez le couvercle avec soin.
- Remettez tout de suite au laboratoire (dans un délai d'une heure) ou conservez au frigo à une température de +4°C pendant au maximum deux heures (certaines espèces microbiennes ne survivent pas plus de deux heures après le prélèvement, alors que d'autres espèces peuvent se multiplier au détriment d'autres, en alternant le rapport quantitatif naturel des différentes composantes microbiennes du matériel, en favorisant ainsi des évaluations incorrectes).
- En cas de recueil sur plusieurs jours successifs, chaque échantillon doit être collecté et remis chaque jour dans l'heure qui suit le recueil.

|                                  |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| MD17 Rev. N° 02                  | REDATTO DA          | APPROVATO DA |
| Data di emissione:<br>10/07/2007 | Pellegrini Cristina | Caola Iole   |