

Instrucciones para la recolección de la muestra de ESPUTO para la detección de MICOBACTERIAS

- > Use para la recolección un recipiente estéril de boca larga con tapa a rosca que puede ser adquirido en farmacia o solicitado en el laboratorio.
- > A la mañana quítese posibles dentaduras postizas y lave la cavidad bucal con solución fisiológica o agua destilada o bien con colutorios y gargarismos.
- > Expectorar en el recipiente estéril con un fuerte tosido y recolecte por lo menos 2 ml de secreción procedente de las bajas vías respiratorias. No introduzca saliva o secreción nasal (en dicho caso la muestra no es reconocida idónea).
- > Enrosque bien la tapa.
- > Envíe al laboratorio lo antes posible para asegurarse que sobrevivan micobacterias y evitar que se multipliquen otros microorganismos contaminantes. Llegado el caso que la entrega se atrase más de una hora conserve en la heladera a +4° C hasta un máximo de 48 horas.
- > Realice la recolección de tres muestras de expectorado en **los días siguientes**.

| | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| MD18 Rev. N° 04 | REDATTO DA | APPROVATO DA |
| Data di emissione: 06/04/2012 | Pellegrini Cristina | Caola Iole |