

Sammlungsmodalität der Auswurfprobe für die Suche nach MIKROBAKTERIEN

- Für das Sammeln einen sterilen Behälter mit weiter Öffnung mit Schraubdeckel verwenden, der in der Apotheke zu kaufen ist oder beim Labor erbeten werden kann.
- Am Morgen eventuelle, herausnehmbare Zahnprothesen entfernen und die Mundhöhle mit physiologischer Kochsalzlösung oder destilliertem Wasser oder mit Mundwässern und Gurgeln reinigen.
- Mittels eines effizienten Hustenanfalls in den sterilen Behälter expektorieren und dabei mindestens 2 ml Sekret aus den unteren Atemwegen sammeln. Keinen Speichel und keine Nasensekretion hineingeben (In diesem Fall wird die Probe für nicht geeignet angesehen.)
- Den Deckel wieder sorgfältig festschrauben.
- So schnell wie möglich dem Labor zustellen, um das Überleben der Mikrobakterien zu gewährleisten und zu vermeiden, dass sich andere, kontaminierende Mikroorganismen vermehren. Bei Verspätung von mehr als einer Stunde bei +4° höchstens 48 Stunden lang im Kühlschrank aufbewahren.
- Das Sammeln von drei Auswurfproben **an aufeinanderfolgenden Tagen** vornehmen.

MD18 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 10/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole