

Sammelmodalität der Stuhlprobe für KOPROKULTUR

- Die Proben im Moment der Entleerung auf einer trockenen und sauberen Oberfläche (z.B. eine Bettpfanne oder ein Blatt Zeitungspapier oder eine geknickte Pappe oder eine Plastiktüte, die auf einem Körbchen oder unter dem Toilettendeckel positioniert wurden) sammeln.

WICHTIG: Der Stuhl darf weder durch Urin, noch durch das Wasser der Toilette kontaminiert sein.

- Den Stuhl von verschiedenen Stellen der gesamten Entleerung entnehmen.
- In einen Plastikbehälter mit Schraubdeckel, der vom Labor geliefert wurde oder in der Apotheke gekauft wurde, eine nussgroße Stuhlportion umfüllen; wenn der Stuhl formlos oder diarrhoisch ist, mindestens 5-10 ml Stuhlmaterial sammeln.
- Den Behälter gut schließen und **SO SCHNELL WIE MÖGLICH** zum Probenannahmeschalter oder zum Labor bringen; wenn der Stuhl **FLÜSSIG** ist, muss die Probe innerhalb von 30 – 60 Minuten ab der Sammlung ins Labor gelangen.
- Sollten mehrere Proben gefordert werden, den Stuhl an abwechselnden Tagen (bis zu drei) sammeln und jede Probe einzeln **SO SCHNELL WIE MÖGLICH** dem Probenannahmeschalter oder dem Labor übergeben.

MD19 Rev. N° 03	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione:		