

Méthode de recueil de l'échantillon de SELLES pour COPROCULTURE

- Recueillez les échantillons au moment de l'évacuation sur une surface sèche et propre (par ex. : un bassin hygiénique, une page de journal, du carton replié ou sur un sachet en plastique, placés sur une corbeille ou sous un couvre-WC).
- IMPORTANT : les selles ne doivent être contaminées ni par les urines ni par l'eau du WC.
- Prélevez les selles à des endroits différents de l'évacuation.
- Transférez une portion de selles correspondant au volume d'une noix dans un récipient doté de bouchon à vis en plastique fourni par le laboratoire ou à acheter en pharmacie ; si les selles sont non-formées ou diarrhéiques, recueillez au moins 5-10 ml de matière fécale.
- Fermez soigneusement le récipient et remettez-le LE PLUS TOT POSSIBLE au guichet de prise en charge des échantillons ou au laboratoire ; si les selles sont LIQUIDES, l'échantillon doit être rapporté au laboratoire dans les 30-60 minutes qui suivent le recueil.
- Si plusieurs échantillons sont demandés, recueillez les selles tous les deux jours (jusqu'à trois) et remettez chaque échantillon séparément LE PLUS TOT POSSIBLE au guichet de prise en charge des échantillons ou au laboratoire.

MD19 Rev. N° 03	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione:		