

كيفية جمع عينة البراز للبحث عن الطفيليات المعوية

- (1) قم بجمع 3 عينات من البراز لأيام متتالية (يوم نعم و يوم لا)
- (2) قم بجمع العينات على سطح جاف و نظيف (على سبيل المثال استعمال نونية أو ورقة جريدة أو كرتونة مطوية أو كيس من البلاستيك يقع وضعه على سلة أو أسفل غطاء التواليت).
- هام :** لا يجب أن يكون البراز مختلطاً بالبول و لا بماء التواليت.
- (3) يجب أخذ العينات من أماكن مختلفة من الغائط.
- (4) قم بوضع العينة في وعاء من البلاستيك مع سدادة ملولبة يقع توفيره من المعمل أو يقع شراؤه من الصيدلية. عينة البراز تكون مساوية في حجمها الجوزة؛ إذا كان البراز غير متكون أو في شكل إسهال، قم بجمع بين 5 و 10 مل من البراز على الأقل.
- (5) قم بغلق الوعاء بإحكام و قم بتسجيل التاريخ و الساعة التي جمعت فيهما العينة؛ قم بحمل العينة في أسرع وقت ممكن إلى شبّاك إستقبال العينات أو إلى المعمل؛ إذا كان البراز سائلاً يجب إيصاله إلى المعمل في مدة زمنية تتراوح بين 30 و 60 دقيقة من وقت الجمع.

البحث عن الأميبا: أرسل عينة البراز بسرعة إلى المختبر مع حفظ الوعاء عائماً في ماء تكون درجة حرارته 37°C.

تحذيرات هامة:

- في الأيام التي تسبق و أثناء عملية جمع عينة البراز تجنّب:
- المسهلات، مضادات الإسهال، مضادات الميكروبات
 - "باريو" BARIO ، "البزموت" BISMUTO، الزيوت المعدنية
 - البقول، الفواكه الجافة، الفاكهة ذات القشرة المتينة (الخوخ، المشمش، الكمثرى، الفراولة، التين، الطماطم)

MD20 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 09/05/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole