Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Laboratorio e Servizi

**Modulo Dipartimentale**

Modalità di esecuzione dello Scotch Test per la ricerca di Enterobius Vermiculairs (ossiuri)

**DETECCIÓN DE HUEVOS DE OXIURO – Enterobius vermicularis – (SCOTCH TEST):**

1) Retire las platinas necesarias para el análisis, en el Laboratorio.

2) La recolección debe ser efectuada al momento al despertarse a la mañana, antes de que el sujeto defeque o de se lave.

3) Use una cinta autoadhesiva trasparente (scotch)

4) Corte con las tijeras un pedazo de cinta autoadhesiva (5-6 cm) un poco más corto que la platina.

5) Apoye la cinta adhesiva en el orificio anal cubriendo bien los pliegues peri-anales por 15-20 segundos.

6) Desprenda la cinta autoadhesiva del orificio anal y aplíquela bien extendida sobre la platina

7) Entregue al laboratorio dentro de las 2-4 horas posteriores a la recolección de la muestra o bien conserve en la heladera por no más de 24-48 horas.

NO son idóneas muestras recolectadas con scotch no trasparente o embadurnadas de materia fecal.

ATENCIÓN: Luego de la recolección de la muestra lávese bien las manos (los huevos seguido son generadores de embriones e infectantes)