

Recoltarea probei de URINĂ pentru detectarea MICOBACTERIILOR (BK)

- Pentru recoltare folosiți un recipient steril cu gura largă și cu capac filetat, pe care îl puteți solicita de la laborator sau cumpăra de la farmacie.
- Spălați-vă bine mâinile și organele genitale externe cu apă și săpun, clătiți abundant cu apă și uscați.
- Deschideți recipientul fără a atinge partea interioară.
- Recoltați în recipient cel puțin 40 ml din prima micțiune de dimineață având grijă ca recipientul să nu vină în contact cu organele genitale externe.
- Închideți imediat recipientul.
- Trimiteți proba către laborator în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura supraviețuirea micobacteriilor și a evita multiplicarea altor microorganisme contaminante. În caz că nu reușiți să aduceți proba în decursul unei ore, păstrați-o în frigider la + 4°C cel mult 48 de ore.
- Se recoltează trei eșantioane în zile diferite.
- NU este potrivită urina recoltată în 24 de ore.
- NU este potrivită proba în cantitate mai mică de 40 ml.

MD15 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole