

Sammlungsmodalität der Urinprobe für die Suche nach MIKROBAKTERIEN (BK)

- Für das Sammeln einen sterilen Behälter mit weiter Öffnung mit Schraubdeckel verwenden, der in der Apotheke zu kaufen ist oder beim Labor erbeten werden kann.
- Die Hände und die äußeren Genitalien gut mit Wasser und Seife waschen, lange nachspülen und abtrocknen.
- Den Behälter öffnen und dabei vermeiden, den Innenbereich zu berühren.
- Im Behälter mindestens 40 ml der ersten Harnentleerung am Morgen sammeln und dabei, während des Sammelns, den Kontakt mit den äußeren Genitalien vermeiden.
- Den Behälter sofort schließen.
- So schnell wie möglich dem Labor zustellen, um das Überleben der Mikrobakterien zu gewährleisten und zu vermeiden, dass sich andere, kontaminierende Mikroorganismen vermehren. Bei Verspätung von mehr als einer Stunde bei +4° höchstens 48 Stunden lang im Kühlschrank aufbewahren.
- Das Sammeln mit drei Proben, die an verschiedenen Tagen gesammelt werden, durchführen.
- Der innerhalb von 24 Stunden gesammelte Urin ist NICHT geeignet.
- Eine Probe mit weniger als 40 ml ist NICHT geeignet.

MD15 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole