

إجراء جمع عينة البول لإجراء الفحص المجهرى البكتيري (BK)

- لجمع البول، قم باستعمال وعاء معقم واسع الفتحة مع سدادة ملولبة يمكن شراؤه من الصيدلية أو يمكن طلبه من المعمل.
- اغسل جيداً اليدين و العضو التناسلي بالماء و الصابون؛ قم بشطف الأعضاء و تنشيفها جيداً.
- قم بفتح الوعاء مع تجنب لمس الجزء الداخلي منه.
- قم بجمع 40 مل على الأقل من أول تبول في الصباح مع تجنب لمس العضو التناسلي خلال عملية الجمع.
- قم بالغلق الفوري للوعاء.
- قم بتسلیم العینة إلى المختبر في أسرع وقت ممكن و ذلك لضمانبقاء البكتيريا على قيد الحياة و تجنب تكاثر الكائنات الحية المجهرية الملوثة. في حال التأخير لأكثر من ساعة، يجب حفظ العينة في الثلاجة في درجة حرارة +4°C لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
- قم بتحصيل 3 عينات يتم جمعها في أيام مختلفة.
- يعتبر البول الذي وقع جمعه في 24 ساعة غير مناسب.
- تعتبر العينة التي تكون كميّتها أقل من 40 مل غير مناسبة.

MD15 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole

