

**Méthode de recueil de l'échantillon d'urine pour la recherche de MICRO-BACTERIES (BK)**

- Utilisez, pour le recueil, un récipient stérile doté d'une grande ouverture et d'un bouchon à vis, fourni par le laboratoire ou à acheter en pharmacie.
- Lavez soigneusement les mains et les organes génitaux externes avec de l'eau et du savon ; rincer abondamment et essuyez.
- Ouvrez le récipient en prenant soin de ne pas toucher la partie interne.
- Recueillez dans le récipient au moins 40 ml de la première miction du matin, en évitant le contact avec les organes génitaux externes pendant le recueil.
- Fermez immédiatement le récipient.
- Envoyez au laboratoire dans les plus brefs délais pour garantir la survie des micro-bactéries et pour éviter la multiplication d'autres microorganismes contaminants. En cas de retard de plus d'une heure, conservez au frigo à une température de +4°C pendant 48 heures au maximum.
- Effectuez le recueil sur trois échantillons collectés dans des jours différents.
- Les urines recueillies dans les 24 heures NE SONT PAS appropriées.
- Les échantillons dont le volume est inférieur à 40 ml NE SONT PAS appropriés.

MD15 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole