

## یورین کلٹر کے لئے بچوں کے پیشاب کے سمپل لینے کا طریقہ کار [یعنی کلکشن بیگ کا استعمال کرنے کا طریقہ کار]

- پیشاب لینے کے لئے ایک پلیسٹک بیگ استعمال کریں جو آپ کسی بھی دواخانے خرید سکتے ہیں۔
- ہاتھ اچھی طرح دھوئیں اور سکھا لیں۔
- اچھی طرح سے بچے [یا بچی] کے اعضاء تناسل اور پرنیم [مقعد اور اعضاء تناسل کے درمیان کا حصہ جسم] کو صابون سے دھو لیں۔ جراثیم ختم کرنے والا محلول استعمال نہ کیجئے۔ پھر پانی سے مل کر اچھی طرح سے دھوئیں اور سکھا دیں۔
- اچھے طریقے سے پلیسٹک بیگ کو اسی جگہ پر لگائیں [یعنی اعضاء تناسل اور پرنیم کی جگہ]۔
- پیشاب کو 60 منٹ کے اندر لے لیں۔

احتیاط برتیئے: پیشاب کو ایک گھنٹے کے اندر اندر لینا ہے۔ اگر اس دوراں بچے سے پیشاب نہیں کیا ہوتا تو اس پلیسٹک بیگ کو اتار کر پھینک دیں۔ پھر دوسری دفعہ ہر چیز دہرائیں [دھونا سکھانا بھی] اور نیا پلیسٹک بیگ استعمال کریں۔

- پلیسٹک بیگ کو اتار کر چبیدار ٹیپ سے بند کر دیں۔ اس پیشاب کو کسی اور ڈبہ یا بوتل میں ٹرانسفر نہ کریں۔
- پلیسٹک بیگ کو عمودی پوزیشن میں کسی ڈبہ یا بوتل میں رکھ دیں۔ ڈبہ کو احتیاط سے بند کر دیں۔
- ایک گھنٹے کے اندر اندر لیبارٹری میں پہنچا دیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو تو سمپل فرج میں [4 ڈگری کے درجہ حرارت پر] رکھ دیں، 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔