部门表格

## 24 小时尿液收集方式 LINGUA CINESE

检验医学部

## 24 小时尿液收集方式

对于尿液一些成分的测定,必须将 24 小时内排泄的所有尿液收集在一个容器中。对于个别检验,收集时还必须使用**防腐剂**,后者**必须留在容器中**。

- 用于每种检验的容器必须在实验室或采样点领取
- 该防腐剂可导致皮肤过敏,因此尿液可以先在一个瓶内收集,然后倒进实验室提供的容器中。
- 早上起床时排尿清空膀胱,**不收集**这次尿液。
- 从此刻起,开始收集当天白天、夜晚和次日早上第一次排出的所有尿液(保存在浴室等阴凉的地方且儿童触及不到之处)。

## 收集结束时

- 如要交送到 Trento、Arco、Cavalese 和 Cles 临床病理实验室的取样中心,测量尿量(在容器上有刻度)并标注在从实验室领取的试管的标签上。混和尿液并填满试管的三分之二。然后将试管交送到取样中心。
- 如要交送到 Borgo、Rovereto 和 Tione 临床病理实验室,请将容器密封好,并在当天早上按取样时间交送到取样点。

有些药物或食物会干扰一些特殊分析物检测结果:香草扁桃酸(VMA),5-羟吲哚乙酸(HIAA),血清素,儿茶酚胺。

在这种情况下,在收集至少3天之前和收集期间,必须遵守以下指示:

- 避免服用咖啡、茶、巧克力、香蕉、鳄梨、茄子、菠萝、李子、西红柿。
- 避免服用阿司匹林、对乙酰氨基酚、左旋多巴、抗精神病药、安妥明。