

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento قسم طب المختبرات	نموذج القسم طريقة جمع عينات البول على مدار 24 ساعة LINGUA ARABA
--	---

طريقة جمع عينات البول على مدار 24 ساعة

لقياس جرعات بعض مكونات البول من الضروري جمع كل البول الذي تم إخراجها خلال 24 ساعة في وعاء . وبالنسبة لبعض التحاليل، يجب أن يتم جمع العينات مع استخدام مادة حافظة والتي يجب أن توضع في الوعاء.

- يجب أخذ الوعاء الملائم لكل نوع تحليل على حده من المعمل أو من نقاط سحب العينات.
- قد تسبب المادة الحافظة تهيج الجلد، لذلك يمكن جمع البول في وعاء أولاً ثم يتم سكه في الوعاء الذي يقدمه المعمل.
- قم بإفراغ المثانة عند الاستيقاظ في الصباح ، ولا تقم بجمع هذا البول.
- من هذه اللحظة قم بجمع كل البول الذي تقوم بإخراجه أثناء النهار والليل والليلا التي تسبق الصباح التالي (قم بحفظه في مكان بارد، مثل الحمام، بعيداً عن متناول الأطفال).

في نهاية جمع العينات:

- لتسليم العينة إلى مراكز سحب العينات التي تتبع معامل التحاليل الطبية لمدن ترينتو وأركو وكافاليزي وكليس، قم بقياس كمية البول المخرجة (بواسطة المقياس المدرج على الوعاء)، وقم بتحديد ما على الملصق الخاص بأنبوب الاختبار الذي يقوم المعمل بتسليمه. قم بمزج البول وأملئ ثلثي أنبوب الاختبار. قم بتسليم الأنبوب إلى مركز سحب العينات.
- لتسليم العينة إلى معامل التحاليل الطبية لمدن بورجو وروفيريتو وتيوني، قم بغلق الوعاء وتسليمه في نفس الصباح إلى نقاط سحب العينات في المواعيد المحددة لذلك.

هناك بعض الأدوية أو الأغذية التي تؤثر على نتيجة قياس جرعات بعض المواد الخاصة التي يتم تحليلها :
حمض Vanilmandelico (AVM)، و-5 هيدروكسي اندول حامض الخليك، السيروتونين، الكاتيكولامينات.

في هذه الحالة يجب مراعاة التعليمات الآتية لمدة ثلاثة أيام على الأقل قبل وأثناء جمع العينات:

- تجنب تناول القهوة، الشاي، الشوكولاته، الموز، الأفوكادو، الباذنجان، الأناناس، الخوخ والطماطم.
- تجنب تناول الأسبرين، الاسيتامينوفين، الليفودوبا، مضادات الدهون و الكلوبيبرات.