

<p style="text-align: center;">   <i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari</i>  <i>Provincia Autonoma di Trento</i> </p> <p>Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio</p>	<p style="text-align: center;">           Formulaire départemental            Méthode de recueil des urines sur 24 heures  <b>LINGUA FRANCESE</b> </p>
--	--

### Méthode de recueil des urines sur 24 heures

Pour le dosage de certains composants des urines, il est nécessaire de recueillir toutes les urines émises dans les 24h dans un récipient. Pour certains examens, le recueil doit être effectué en utilisant un **liquide de conservation** (conservateur), qui **doit rester dans le récipient**.

- Le récipient adapté à chaque type d'examen doit être remis par le laboratoire ou par les points de prélèvement.
- Le liquide de conservation peut provoquer des irritations de la peau ; pour cette raison, les urines peuvent être d'abord recueillies dans un pot et ensuite transvasées dans le récipient fourni par le laboratoire.
- **Videz** la vessie quand vous vous levez le matin et **ne recueillez pas** cette urine.
- A partir de ce moment, collectez toutes les urines de la journée et de la nuit, ainsi que les premières urines du matin suivant (conservez-les dans un endroit frais, par exemple dans la salle de bains, hors de la portée des enfants).

Après le recueil :

- Pour remettre le récipient à l'un des centres de prélèvement qui appartiennent aux laboratoires de pathologie clinique de Trento, Arco, Cavalese et Cles, mesurez la quantité d'urines émises (échelle graduée sur le récipient) et notez-la sur l'étiquette de l'éprouvette remise par le laboratoire. Remuez vos urines et remplissez l'éprouvette jusqu'aux 2/3. Remettez l'éprouvette au centre de prélèvement.
- Pour la remise aux laboratoires de pathologie clinique de Borgo, Rovereto et Tione, bouchez le récipient et remettez-le le matin même dans les points de prélèvement pendant les heures d'ouverture.

Certains médicaments ou aliments peuvent influencer sur le résultat du dosage de certains analytes particuliers : **Acide Vanilmandélique (AVM)**, **Acide 5-Hydroxy-Indolacétique (Hiaa)**, **Sérotonine**, **Catécholamine**.

Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les indications suivantes pendant au moins **trois jours avant le début et pendant le recueil** :

- ne pas consommer café, thé, chocolat, bananes, avocats, aubergines, ananas, prunes et tomates ;
- éviter la prise d'aspirine, de paracétamol, de lévodopa, de neuroleptiques et de clofibrate.

MD12 Rév. n° 05 du 23/03/2010	Rédigé par le responsable du Service départemental de Qualité	Approuvé par le directeur de département
-------------------------------	---	--

