


CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA SCRITTA N. 1



1.	<p>Il signor Fabio è seguito a domicilio dopo un primo ricovero per scompenso cardiaco. Quali tra i seguenti dati dovrà monitorare l'infermiere?</p> <p>A) peso, presenza edemi declivi, tolleranza allo sforzo B) temperatura corporea, presenza edemi declivi, prurito C) peso, temperatura corporea, nistagmo D) presenza ematomi, presenza edemi declivi, prurito</p>
2.	<p>Il signor Marco è un giovane affetto da diabete di tipo 1 in fase di compenso e vorrebbe iniziare a svolgere attività fisica. Quali indicazioni fornirà l'infermiere per eseguire in sicurezza l'attività fisica?</p> <p>A) portare con sé il glucometro e cibi ricchi di carboidrati a lunga durata d'azione e rapido assorbimento B) effettuare una colazione leggera, priva di carboidrati, immediatamente prima dell'attività fisica C) effettuare pasti abbondanti, ricchi di soli carboidrati, immediatamente prima dell'attività fisica D) portare con sé solamente il glucometro per rilevare la glicemia ogni 20 minuti</p>
3.	<p>Quale tra le seguenti alterazioni ematochimiche caratterizza un paziente con cirrosi epatica in stadio avanzato:</p> <p>A) allungamento INR B) ipotiroidismo C) iperprogesteronemia D) ipocalcemia</p>
4.	<p>La Raccomandazione ministeriale sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio (n. 1 del 2008) prevede che, in fase di somministrazione, il secondo operatore sanitario debba verificare:</p> <p>A) solo la documentazione del paziente e la corretta velocità di infusione B) solo la documentazione del paziente e la presenza del consenso del paziente C) la prescrizione dell'infusione e la presenza del consenso del paziente D) l'identità del paziente e la corretta velocità di infusione</p>
5.	<p>E' indicato utilizzare i guanti monouso per:</p> <p>A) aiutare il paziente disfagico nell'assunzione del pasto B) effettuare la palpazione addominale C) effettuare l'auscultazione polmonare D) reperire un accesso vascolare periferico</p>
6.	<p>Per la gestione del paziente sottoposto a precauzioni aggiuntive da contatto, quali tra i seguenti interventi sono raccomandati dalle linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022):</p> <p>A) isolamento in stanza con pressione negativa, uso di guanti, disinfezione dei presidi B) isolamento in stanza singola, uso di guanti, personalizzazione dei presidi C) isolamento di coorte, uso di guanti sterili, personalizzazione dei presidi D) isolamento di coorte, uso di guanti monouso e di filtrante facciale</p>
7.	<p>La posizione laterale di sicurezza:</p> <p>A) si effettua se la vittima è incosciente e respira B) provoca crisi epilettiche C) si effettua solo se la vittima è traumatizzata D) provoca arresto respiratorio</p>
8.	<p>Ad un paziente sono stati prescritti 12,5 mg di un farmaco antiemetico. Il farmaco è disponibile in sciroppo contenente 10 mg per 10 ml. Quanti ml somministrerà l'infermiere?</p> <p>A) 125 ml B) 50 ml C) 12,5 ml D) 10 ml</p>
9.	<p>La durata dell'infusione di una sacca di concentrato eritrocitario in un paziente in buon compenso cardiocircolatorio che non presenta complicanze durante la somministrazione, dovrebbe terminare entro:</p> <p>A) 6 ore B) la fine del turno C) 2 ore D) 12 ore</p>

10.	<p>Nei pazienti con colostomia l'irrigazione si pratica per:</p> <p>A) evitare le irritazioni cutanee B) diminuire il nistagmo C) regolarizzare le evacuazioni D) bloccare la peristalsi</p>
11.	<p>Quali possono essere le maggiori complicanze della disfagia?</p> <p>A) disidratazione, malnutrizione, polmonite ab ingestis B) malnutrizione, polmonite ab ingestis, acufeni C) disidratazione, malnutrizione, delirium D) ritenzione urinaria, malnutrizione, polmonite ab ingestis</p>
12.	<p>Secondo il protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery 2018) in caso di interventi colon-rettali in elezione è indicato un tempo di digiuno preoperatorio di:</p> <p>A) minimo 6 ore da liquidi chiari e 2 da alimenti solidi B) minimo 2 ore sia da liquidi chiari che da alimenti solidi C) non è richiesto nessun digiuno né da liquidi né da solidi D) minimo 2 ore per i liquidi chiari e 6 ore da alimenti solidi</p>
13.	<p>Per aiutare un paziente con inabilità ad un emisoma (emiplegia) a spogliarsi è corretto togliere la camicia partendo da:</p> <p>A) arto plegico e poi procedere con quello sano B) arto sano e poi procedere con quello plegico C) arto plegico e poi procedere con quello infetto D) testa e poi procedere con l'arto plegico</p>
14.	<p>L'infermiere deve pianificare l'attività da attribuire all' Operatore Socio Sanitario (OSS). Quale delle seguenti attività può assegnare?</p> <p>A) cateterismo vescicale estemporaneo B) esecuzione clisma con sonda evacuativa C) esecuzione microclisma (minore 200 ml) D) somministrazione terapia endovenosa</p>
15.	<p>Per prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione, oltre a mantenere la cute pulita e asciutta, quali tra le seguenti indicazioni sono raccomandate dalle linee guida NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019?</p> <p>A) effettuare massaggi e applicare prodotti a base di iodopovidone B) applicare medicazioni a base di alginato di calcio C) applicare quotidianamente medicazioni in idrofibra D) favorire la ridistribuzione della pressione sulla cute delle zone a rischio</p>
16.	<p>Quale fra le seguenti scale di valutazione viene utilizzata per misurare il dolore nel paziente adulto con grave compromissione cognitiva?</p> <p>A) PAINAD B) BARTHEL C) CONLEY D) NEWS</p>
17.	<p>Con quale manovra si ricerca la presenza di edema ad un arto inferiore:</p> <p>A) compressione digitale sopra la zona ossea B) palpazione polsi arteriosi C) auscultazione della zona sospetta D) test di Mingazzini</p>
18.	<p>Quali, fra i seguenti trattamenti, sono consigliati per la cura della BPCO riacutizzata:</p> <p>A) broncodilatatori, corticosteroidi e ossigenoterapia B) broncocostrittori, corticosteroidi e ossigenoterapia C) broncodilatatori, anticoagulanti e ossigenoterapia D) broncodilatatori, corticosteroidi e lassativi</p>
19.	<p>Poliuria, polidipsia, confusione mentale possono essere segni e sintomi di:</p> <p>A) artrite reumatoide B) diabete mellito C) asma bronchiale D) esofagite da reflusso</p>
20.	<p>Gli effetti collaterali della terapia con oppioidi sono principalmente:</p> <p>A) aumento del tono muscolare, nausea, iperglicemia, insonnia B) oliguria, rallentamento psicomotorio, ipoglicemia, stipsi C) insonnia, aumento dell'appetito, stipsi, poliuria D) stipsi, sonnolenza, rallentamento psicomotorio, nausea</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA SCRITTA N. 2




1.	<p>Il sig. Giorgio è ricoverato da due giorni in Medicina Interna per recidiva di scompenso cardiaco, motivo per il quale ha iniziato la terapia diuretica. Quali aspetti monitorerà l'infermiere per valutare l'efficacia della terapia?</p> <p>A) peso, diuresi e qualità del respiro B) peso, diuresi e presenza di brivido scuotente C) ecchimosi, petecchie e qualità del respiro D) ecchimosi, diuresi e presenza di brivido scuotente</p>
2.	<p>Quali, tra i seguenti, sono segni tipici del paziente con cirrosi epatica in fase avanzata:</p> <p>A) pleurite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo B) ascite, emiparesi, alterazione dello stato cognitivo C) ascite, alterazione dell'udito, varici esofagee D) ascite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo</p>
3.	<p>Una ragazza di 19 anni riferisce all'infermiere di famiglia di essere preoccupata perché da qualche tempo presenta poliuria, perdita di peso e negli ultimi giorni anche molta sete che non scompare con l'assunzione di acqua. Quale intervento prioritario eseguirà l'infermiere?</p> <p>A) rilevazione della glicemia capillare per sospetto stato iperglicemico B) rilevazione della temperatura corporea per sospetta infezione C) valutazione del dolore per sospetta occlusione intestinale D) rilevazione dei parametri vitali per sospetta emorragia</p>
4.	<p>Il laboratorio comunica telefonicamente al reparto che il valore della Sodiemia di un paziente è di 121 mEq/L (range di riferimento: 135 mEq/L – 146 mEq/L). L'infermiere che riceve la comunicazione:</p> <p>A) documenta in cartella la comunicazione ricevuta, informa il medico e attua le prescrizioni terapeutiche B) informa il collega infermiere al cambio turno e si attiva per attuare le prescrizioni terapeutiche C) ritiene di non contattare il medico nell'immediato poiché il valore non è significativo D) documenta in cartella la comunicazione ricevuta e al cambio turno informa il coordinatore</p>
5.	<p>Secondo le linee guida OMS (2009) quale delle seguenti affermazioni sulla frizione delle mani con un prodotto a base alcolica è corretta?</p> <p>A) l'igiene delle mani con frizione alcolica rimuove solo le spore B) la tecnica di igiene delle mani con frizione alcolica è da prediligere al lavaggio con acqua e sapone C) la frizione alcolica deve essere eseguita sempre in presenza di mani visibilmente sporche D) l'igiene delle mani con frizione alcolica si esegue esclusivamente prima di indossare i guanti sterili</p>
6.	<p>Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022) l'uso della mascherina chirurgica viene raccomandato per la prevenzione delle patologie a trasmissione:</p> <p>A) oro-fecale B) droplet C) da contatto D) sessuale</p>
7.	<p>Secondo le linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare nell'adulto (ERC 2021) la prima cosa che deve verificare l'infermiere in caso di emergenza è:</p> <p>A) la pervietà delle vie aeree della vittima B) le condizioni di sicurezza ambientale C) la presenza di polso carotideo della vittima D) di avere a disposizione un DAE</p>
8.	<p>Il medico prescrive 600 mg di un farmaco per bocca. L'infermiere ha a disposizione compresse da 300 mg. Quante compresse somministrerà l'infermiere al paziente?</p> <p>A) ½ compressa B) 1 compressa C) 1+ ½ compresse D) 2 compresse</p>
9.	<p>La reazione trasfusionale immediata può presentarsi:</p> <p>A) nei primi 15-20 minuti dall'inizio dell'infusione B) dopo la seconda ora dall'inizio dell'infusione C) dopo 8 ore dal termine dell'infusione D) a distanza di 24 ore dal termine dell'infusione</p>

10.	In seguito al cateterismo vescicale estemporaneo quale delle seguenti complicanze si possono verificare? A) ematuria transitoria B) ipertensione arteriosa C) alterazione della perfusione D) alterazione dell'alvo
11.	Il confezionamento della stomia intestinale: A) non permette il controllo volontario dell'eliminazione B) permette il controllo volontario dell'eliminazione C) garantisce solo l'eliminazione di feci normoformate D) garantisce solo l'eliminazione di feci liquide
12.	La presenza di nausea e vomito nel postoperatorio può: A) favorire la ripresa dell'alimentazione postoperatoria B) garantire un veloce recupero dell'attività motoria C) causare disidratazione e ostacolare la rialimentazione D) ridurre l'inappetenza e il tempo di ripresa dell'alimentazione
13.	Per favorire l'autonomia nella vestizione in un paziente con inabilità di un emisoma (emiplegia), l'infermiere consiglierà di iniziare ad indossare la camicia dal: A) arto sano e poi procedere con l'arto plegico B) arto plegico e poi procedere con l'arto sano C) arto plegico e poi procedere con l'arto infetto D) testa e poi procedere con l'arto plegico
14.	Quali fra le seguenti attività si possono attribuire all'Operatore Socio Sanitario (OSS)? A) rilevazione parametri vitali B) elettroencefalogramma C) cateterismo vescicale D) somministrazione della terapia endovenosa
15.	Un obiettivo fondamentale della presa in carico delle cure palliative è: A) fornire assistenza sociale solo in ambiente ospedaliero B) controllare i sintomi solo dei pazienti pediatrici con neoplasia avanzata C) controllare i sintomi solo dei pazienti adulti con neoplasia avanzata D) fornire assistenza per alleviare il dolore e la sofferenza del paziente
16.	Quale, tra le seguenti scale di valutazione, viene utilizzata per misurare il rischio di lesioni da pressione: A) BRADEN B) NRS C) MUST D) GLASGOW COMA SCALE
17.	Per ascite si intende una raccolta di liquido: A) nella cavità peritoneale B) nella cavità ascellare C) nella cavità toracica D) nello spazio intratecale
18.	Quali, tra le seguenti, sono manifestazioni dell'evoluzione della BPCO cronica: A) progressiva riduzione della forza muscolare e riduzione della tolleranza all'esercizio fisico B) progressivo aumento della forza muscolare e riduzione della tolleranza all'esercizio fisico C) immediata riduzione della forza muscolare e aumento della tolleranza all'esercizio fisico D) immediato aumento della forza muscolare e aumento della tolleranza all'esercizio fisico
19.	Tosse stizzosa, edemi declivi, intolleranza all'attività fisica, possono essere segni e sintomi di: A) demenza senile B) malattia di Parkinson C) scompenso cardiaco D) diabete mellito
20.	L'antagonista del warfarin sodico è: A) vitamina K B) vitamina A C) vitamina D D) vitamina B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
 E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA SCRITTA N. 3



1.	In una paziente anziana autosufficiente e collaborante ricoverata per iniziale scompenso cardiaco quale modalità è indicata per monitorare la diuresi? A) bidone per la raccolta urine B) cateterismo vescicale a permanenza C) cateterismo vescicale estemporaneo D) pesatura del pannolone
2.	Quali sono i segni e sintomi precoci dell'ipoglicemia che una persona affetta da diabete deve saper riconoscere? A) aumento dell'appetito, aumento della sete e diarrea B) dolore al petto, difficoltà respiratoria e perdita di coscienza C) sudorazione eccessiva, disuria e difficoltà respiratoria D) sudorazione eccessiva, vertigini e formicolii nelle dita o intorno alla bocca
3.	Quale di questi esami ematici si utilizza per valutare l'andamento dell'encefalopatia porto sistemica? A) emoglobina glicata B) ammonio C) alfafetoproteina D) ormoni tiroidei
4.	Secondo la "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli" (n.18-2018) risulta fondamentale che medici, farmacisti e infermieri adottino: A) abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli "standardizzati" B) abbreviazioni, acronimi, sigle e note non "standardizzati" C) abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli in uso solo nel quotidiano D) abbreviazioni, acronimi, sigle e note in uso solo nel quotidiano
5.	L'uso della frizione alcolica è una modalità di igiene delle mani che viene utilizzata: A) solo in caso di assistenza a pazienti in isolamento da contatto B) quando le mani sono visibilmente sporche C) quando le mani non sono visibilmente sporche D) solo in caso di assistenza a pazienti in isolamento aereo
6.	Secondo la normativa nazionale dei rifiuti sanitari (DPR n.254/2003) la sacca delle urine vuota senza tracce visibili di sangue si classifica come rifiuto: A) pericoloso a rischio infettivo B) pericoloso non a rischio infettivo C) non pericoloso D) assimilabile agli urbani
7.	Secondo le linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare nell'adulto (ERC 2021) il "gasping" o respiro agonico è una condizione respiratoria: A) efficace a garantire gli scambi gassosi B) indicativa per iniziare le manovre rianimatorie C) efficace e con movimento muscolare volontario D) indicativa di danno della parete addominale
8.	Ad un paziente è stata prescritta digossina 0,125 mg per via orale. E' disponibile solo la confezione di compresse da 0,250 mg. Quante compresse somministrerà l'infermiere? A) 1 compressa B) 1+ 1/2 compresse C) 1/2 compressa D) 2 compresse
9.	Secondo la "Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0" (n. 5-2020) in caso di paziente vigile e collaborante, al momento della richiesta trasfusionale e del prelievo per le indagini pretrasfusionali, l'operatore deve identificare il paziente: A) solo attraverso la lettura del braccialetto identificativo B) chiedendo al paziente di declinare i propri dati anagrafici C) chiedendo i dati anagrafici ad un familiare di riferimento D) solo attraverso la consultazione della documentazione clinica

10.	In un paziente adulto, in assenza di altre indicazioni, ogni quanto è necessario sostituire la medicazione trasparente semipermeabile di un catetere venoso centrale? A) una volta per turno B) ogni 24 ore C) ogni 14 giorni D) ogni 7 giorni
11.	L'igiene della stomia e della cute peristomale richiede una tecnica: A) pulita, utilizzando acqua e sapone neutro B) asettica con garze sterili e soluzione fisiologica 0,9% C) pulita, utilizzando un antisettico su base alcolica D) asettica con garze sterili, acqua e sapone neutro
12.	Al rientro in reparto del paziente dopo intervento chirurgico in anestesia generale, quale tra le seguenti valutazioni l'infermiere effettua prioritariamente? A) parametri vitali, stato di coscienza, ferita e drenaggi, dolore B) parametri vitali, stato nutrizionale, ferita e drenaggi, tolleranza allo sforzo C) peso e altezza, stato di coscienza, ferita e drenaggi, dolore D) parametri vitali, stato di coscienza, ferita e drenaggi, tolleranza allo sforzo
13.	Quali tra le seguenti sono le principali complicanze dell'aspirazione naso-oro tracheale? A) ipercapnia, ipertensione, tachicardia, traumi della mucosa tracheale B) ipossiemia, ipertensione, bradicardia, traumi della mucosa esofagea C) ipossiemia, ipotensione, bradicardia, traumi della mucosa tracheale D) ipercapnia, ipotensione, bradicardia, traumi della mucosa esofagea
14.	Quale attività è prevista dal profilo nazionale dell' Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato Regioni, 2001)? A) esecuzione di clisma con farmaco B) medicazione ferita infetta C) preparazione della terapia orale D) aiuto nell'assunzione della terapia orale
15.	Le linee guida NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019 raccomandano per la prevenzione delle lesioni da pressione di mobilizzare un paziente posizionato su un materasso standard (non antidecubito): A) ogni 6 ore B) una volta per turno C) ogni 2 ore D) ogni 8 ore
16.	Quale scala di valutazione si utilizza per stabilire il grado di autonomia del paziente? A) NRS B) PAINAD C) BARTHEL D) MUST
17.	Quali, tra i seguenti segni e sintomi, caratterizzano il paziente affetto da BPCO severa? A) respiro a labbra socchiuse, poliuria, cute itterica B) tachipnea, turgore delle giugulari, cute itterica C) utilizzo muscoli accessori, bradipnea, poliuria D) respiro a labbra socchiuse, tachipnea, cianosi periferica
18.	Quali sono i vantaggi che apporta l'utilizzo del distanziatore nella terapia inalatoria? A) aumentare l'inalazione profonda di particelle di piccolo diametro B) diminuire l'inalazione profonda di particelle di piccolo diametro C) favorire il deposito delle particelle solo nelle alte vie respiratorie D) favorire l'adesione delle particelle nell'oro faringe
19.	Deviazione della rima buccale, emisindrome sensitivo motoria, emianopsia, afasia possono essere segni e sintomi di: A) diabete mellito B) BPCO C) ictus D) pancreatite
20.	L'incremento della produzione notturna di urina con aumento della frequenza della minzione nelle ore di sonno si definisce: A) poliuria B) nicturia C) ematuria D) stranguria



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Eleduero Perchi

Trento, 29 maggio 2023
PROVA SCRITTA N. 4



1.	La signora Alda, affetta da scompenso cardiaco, è in carico al servizio di cure domiciliari. Quali dati raccoglierà l'infermiere per individuare precocemente un'eventuale riacutizzazione della patologia? A) peso, edemi declivi, ortopnea B) atassia, edemi declivi, ortopnea C) peso, afasia, ortopnea D) peso, edemi declivi, ulcere vascolari
2.	Poliuria, polidipsia, nicturia, vista offuscata e perdita di peso potrebbero essere segni di: A) iporessia B) ipertermia C) iperglicemia D) ipotensione
3.	Quale di questi esami ematici si utilizza per valutare l'andamento dello scompenso cardiaco? A) emoglobina glicata B) ammonio C) ProBNP D) alfafetoproteina
4.	Giulia ha 30 anni ed è affetta da diabete di tipo 1. Annualmente ripete la visita oculistica che si rende necessaria per identificare precocemente: A) retinopatia diabetica, complicanza molto rara del diabete che si manifesta all'esordio della malattia B) retinopatia diabetica che può essere asintomatica anche in presenza di gravi lesioni retiniche C) glaucoma che deve essere individuato nei pazienti che hanno appena preso la patente D) glaucoma che può manifestarsi improvvisamente generando gravi lesioni retiniche
5.	Secondo la Raccomandazione Ministeriale n. 10 per la prevenzione degli errori di terapia con farmaci LASA (Look Alike/Sound Alike) quale delle seguenti affermazioni è corretta? A) disporre separatamente quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni B) disporre vicini quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili senza evidenziarne la somiglianza per non creare confusione, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni C) segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni D) segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, chiedendo al medico anche tramite richieste verbali o telefoniche la sostituzione di tali farmaci
6.	Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022) è indicato utilizzare i guanti per: A) rilevare la pressione arteriosa di un paziente con epatite C B) mobilitare il paziente con precauzioni da contatto C) diluire i farmaci oppiacei per somministrazione endovenosa D) rilevare la presenza del polso carotideo al paziente incosciente
7.	Secondo la normativa nazionale dei rifiuti sanitari (DPR n.254/2003) il flacone vuoto della soluzione di cloruro di sodio si classifica come: A) pericoloso a rischio infettivo B) pericoloso non a rischio infettivo C) rifiuto speciale D) assimilabile agli urbani
8.	Secondo le linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare nell'adulto (ERC 2021) dopo che il defibrillatore automatico ha erogato la scarica e sono ricomparsi segni di circolo sul paziente è necessario: A) attendere l'equipe di soccorso avanzato B) controllare la presenza di respiro spontaneo C) praticare un minuto di rianimazione cardiopolmonare D) ventilare il paziente a 10 atti/min
9.	Il medico prescrive atropina 0,1 mg. Si hanno a disposizione fiale da 0,2 mg in 1 ml. Quanti ml dovranno essere aspirati? A) 0,1 ml B) 0,5 ml

	<p>C) 1 ml D) 1 mg</p>
10.	<p>In caso di una reazione trasfusionale durante l'infusione di concentrati eritrocitari l'infermiere: A) prosegue l'infusione fino al termine senza consultare il medico B) controlla la presenza di flebite ed informa il medico C) interrompe immediatamente l'infusione e informa il medico D) informa il medico e contatta il centro antiveleni</p>
11.	<p>Quale tipo di stomia richiede un monitoraggio idroelettrolitico frequente? A) colostomia discendente B) ileostomia C) cistostomia D) sigmoidostomia</p>
12.	<p>Una paziente presenta disuria, febbre, dolore sovrapubico ed ematuria. L'infermiere ipotizzerà la presenza di: A) infezione vie aeree B) miocardite C) infezione delle vie urinarie D) occlusione intestinale</p>
13.	<p>Al rientro in reparto del paziente sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia generale, oltre alla rilevazione dei parametri vitali e dello stato di coscienza, quali altri dati raccoglierà l'infermiere? A) dolore, nausea e vomito B) dolore, BMI, bradicinesia C) dolore, peso e altezza D) BMI, vomito, bradicinesia</p>
14.	<p>Le complicanze più frequenti della nutrizione enterale sono: A) stipsi, aspirazione e polmonite, stranguria, distensione e dolore addominali B) disuria, stipsi, distensione e dolore addominali, aspirazione e polmonite C) distensione e dolore addominale, diarrea, stipsi, aspirazione e polmonite D) distensione e dolore addominale, aspirazione e polmonite, otalgia, ipertermia</p>
15.	<p>Quale attività è prevista dal profilo nazionale dell' Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato Regioni, 2001)? A) interventi di comfort, igiene e sicurezza degli ambienti B) somministrazione della terapia endovenosa C) esecuzione clisma con sonda rettale D) esecuzione ECG diagnostico</p>
16.	<p>Ad un paziente che soffre di nausea e vomito, con capacità di deglutizione conservata, in associazione alla terapia antiemetica prescritta dal medico, quali consigli fornisce l'infermiere? A) mangiare poco e spesso, masticare lentamente, preferire cibi asciutti a temperatura ambiente B) mangiare quando sente lo stimolo della fame, masticare lentamente, preferire cibi liquidi e caldi C) mangiare solo nei tre pasti principali, preferire cibi iperproteici e ipercalorici a temperatura ambiente D) mangiare cibi freschi, freddi e ricchi di scorie, assumere integratori iperproteici tra un pasto e l'altro</p>
17.	<p>Quale scala di valutazione si utilizza per il monitoraggio delle lesioni da pressione? A) NEWS B) PUSH C) MUST D) GLASGOW COMA SCALE</p>
18.	<p>In un paziente affetto da BPCO, adeguatamente idratato, quali tra i seguenti indicatori sono segni di riacutizzazione della patologia? A) aumento delle secrezioni con variazione delle caratteristiche dell'espettorato B) riduzione delle secrezioni senza variazione delle caratteristiche dell'espettorato C) aumento della dispnea e tosse e miglioramento della tolleranza all'attività fisica D) riduzione della dispnea e tosse e miglioramento della tolleranza all'attività fisica</p>
19.	<p>Flapping tremor, spider nevi, ittero e ascite possono essere segni di: A) demenza senile B) BPCO C) insufficienza renale D) cirrosi epatica</p>
20.	<p>Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2011) il set infusione per la somministrazione in continuo della nutrizione parenterale totale deve essere sostituito: A) una volta per turno B) ogni 24 ore C) ogni 7 giorni D) ogni 72 ore</p>

Eleanora Pochi

[Handwritten signatures]





CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA PRATICA N. 1

1. Al signor Luigi di 50 anni ricoverato in U.O. di Pneumologia deve essere posizionato un catetere venoso periferico. Per ciascuno dei 5 aspetti sotto riportati, descriva quanto indicato dalle buone pratiche e dalle linee guida.

Quesito	Risposta e motivazione
comunicazione con il paziente e comfort ambientale	
criteri per la scelta del presidio vascolare	
tipologia dei dispositivi di protezione individuale	
criteri per la scelta della sede di posizionamento e della preparazione cutanea	
tipologia di medicazioni e relativa frequenza di sostituzione	

2. Il signor Franco di 84 anni è stato ricoverato in geriatria per riacutizzazione di scompenso cardiaco. Descriva 5 problemi correlati alla patologia e/o all'ospedalizzazione che presiederebbe nelle prime 24/48 ore.

1.
2.
3.
4.
5.

3. In previsione della dimissione di un paziente operato di gastrectomia totale quali indicazioni fornirebbe rispetto all'alimentazione?

--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA PRATICA N. 2

1. Alda una signora di 60 anni è ricoverata in U.O. di Medicina ad alta intensità. Si rende necessario posizionare un catetere vescicale a permanenza. Per ciascuno dei 5 aspetti sotto riportati, descriva quanto indicato dalle buone pratiche e dalle linee guida.

Quesito	Risposta e motivazione
comunicazione con il paziente e comfort ambientale	
criteri per la scelta del presidio	
criteri per la scelta dei guanti	
preparazione del meato urinario	
dati da riportare in documentazione clinica	

2. Descriva 5 azioni per prevenire le cadute in un anziano assistito al domicilio dal Servizio Cure Domiciliari.

1.
2.
3.
4.
5.


3. In previsione della dimissione di una signora operata di mastectomia destra con linfadenectomia ascellare omolaterale quali indicazioni fornirebbe per prevenire la comparsa di linfedema?

--

Andrea Pinter

[Signature]

[Signature]





CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA PRATICA N. 3

1. La signora Franca di 80 anni è in carico al Servizio di Cure domiciliari per un monitoraggio glicemico capillare. Per ciascuno dei 5 aspetti sotto riportati, descriva quanto indicato dalle buone pratiche e dalle linee guida.

Quesito	Risposta e motivazione
comunicazione con la paziente	
scelta del sito di puntura	
preparazione della cute	
necessità e tipologia di dispositivi di protezione individuale	
strategie per aumentare il flusso nel sito di puntura	

2. Descriva 5 azioni per prevenire le cadute in un anziano ricoverato in U.O. Medicina Interna:

1.
2.
3.
4.
5.

3. Il signor Mario è in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico in anestesia generale per asportazione epatocarcinoma. Quali indicazioni fornirebbe, durante la visita ambulatoriale di prericovero, in previsione dell'intervento.

--



Eleduato Perini

GCAR



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA PRATICA N. 4

1. Dopo aver identificato correttamente il paziente, tra i controlli che mette in atto per garantire in sicurezza il processo di somministrazione della terapia, ne descriva altri 5.

1.
2.
3.
4.
5.

2. Il signor Pietro di 88 anni, affetto da decadimento cognitivo, è allettato e da qualche giorno rifiuta di alimentarsi; vive con il figlio che lo assiste ed è in carico al Servizio di Cure Domiciliari.

Descriva 5 aspetti che l'infermiere presidia per garantire l'assistenza.

1.
2.
3.
4.
5.

3. La signora Adele è stata sottoposta ad intervento chirurgico di isterectomia in anestesia generale. Descriva quali aspetti l'infermiere dovrà monitorare nell'immediato post operatorio.

--

Ebeowera Parki

